



INMUNIZACIONES

¿Que son las inmunizaciones?

Los bebés nacen con la protección (inmunidad) que ellos reciben de sus madres. Pero la protección de ciertas enfermedades sólo dura durante un corto tiempo, por eso el bebé necesita más protección en forma de las inmunizaciones (vacunaciones).

Las inmunizaciones usan una cantidad muy pequeña de un germen debilitado o muerto que causa la enfermedad específica. Hace al cuerpo actuar como si fuera una infección real. El cuerpo combate la "infección" y recuerda el germen para que después rápidamente pueda combatirlo si entra en el cuerpo.

El proveedor de cuidado de salud de su niño decidirá las inmunizaciones y el programa mejor para su niño. Sin embargo hay un tiempo básico que usted puede usar como una guía.

La Vacuna de Hepatitis B (HepB)

- Primera dosis poco después de nacimiento y antes de dejar el hospital
- Segunda dosis por lo menos 4 semanas después de la primera dosis (un mes de edad)
- Tercera dosis por lo menos 16 semanas después de la primera dosis y por lo menos 8 semanas después de la segunda dosis (4 meses de edad)
- Última dosis en la serie después de 24 semanas (6 meses) de edad.

Difteria, Tétano y Pertussis (la tos ferina) (DtaP)

- Primera dosis a los 2 meses de edad
- Segunda dosis a los 4 meses de edad
- Tercera dosis a los 6 meses de edad
- Cuarta dosis de los 12-18 meses de edad (por lo menos 6 meses después de la tercera dosis)
- Dosis Final en la serie entre los 4 y 6 años de edad.

Tipo B de Haemophilus Influenzae (Hib)

- Primera dosis a los 2 meses de edad
- Segunda dosis a los 4 meses de edad
- Tercera dosis a los 6 meses de edad
- Dosis Final después de 12 meses de edad

Sarampión, Papera, y Rubéola (el sarampión alemán) (MMR)

- Primera dosis entre 12 y 18 meses de edad
- Segunda (última) dosis entre 4 y 6 años de edad

Varicella (varicelas)

- Una dosis después de los 12 meses de edad.

Vacuna Pneumococcal (Pulmonía) (PVC)

- Primera dosis a los 2 meses de edad
- Segunda dosis a los 4 meses de edad
- Tercera dosis a los 6 meses de edad
- Dosis Final a los 12 meses o mayor

Influenza (Gripe)

- Cada año, empezando a los 6 meses de edad.

Hepatitis A

- Esta se recomienda para los niños y adolescentes en los estados y regiones seleccionados y ciertos grupos de alto riesgo. (Hable con el proveedor de cuidado de salud de su niño sobre esto).
- La Segunda dosis debe administrarse por lo menos con 6 meses de separación.